

Dados gerais para espécies de aromáticas e condimentares

Espécie	Nº sementes por kg	Média sementes por kg	Distância entre linhas	Distância entre plantas	Quantidade de sementes ou plantas por ha		Profund. sementeira	Temperatura de germinação			Tempo germinação	Poder germinativo	Ciclo de cultivo
					Directa	Plantação		Mín.	Máx.	Ideal			
Agrião de Água	3.500.000 - 4.000.000	3.700.000						8°C	20°C	10°C	4 - 14 dias		4 meses
Agrião de Horta	1.200.000 - 1.400.000	1.160.000	25-35 cm	8-15cm							25 - 30 dias		4 meses
Cebolinho	300.000 - 350.000	320.000					0,5 - 1 cm				6 - 12 dias		12 meses
Coentro	70.000 - 100.000	80.000	10 - 15 cm	10 - 15 cm			1 cm	18°C	30°C	25°C	8 - 20 dias		3 meses
Funcho	190.000 - 210.000	200.000									7 - 14 dias		
Mangericão	700.000 - 850.000	800.000					0,5 - 1 cm	18°C	28°C	22°C	6 - 12 dias		3 meses
Mangerona	700.000 - 850.000	800.000					0,5 - 1 cm				6 - 12 dias		3 meses
Rúcula cultivada	520.000 - 580.000	550.000	15 - 30 cm	15 - 20 cm			0,5 - 1 cm	16°C	22°C	20°C	6 - 10 dias		3 meses
Rúcula selvática	5.000.000 - 6.500.000	6.000.000	15 - 30 cm	15 - 20 cm			0,5 - 1 cm	16°C	22°C	20°C	6 - 10 dias		3 meses
Salsa Comum	600.000 - 700.000	650.000	25 - 30 cm	5 cm			0,5 - 1 cm	12°C	25°C	22°C	16 - 32 dias		3 - 6 meses
Salsa Gigante	300.000 - 400.000	350.000	25 - 30 cm	5 cm			0,5 - 1 cm	12°C	25°C	22°C	16 - 32 dias		3 - 6 meses
Stevia		2.000		50 - 20 cm	1g / 10 m2			20°C	25°C	34°C	5 - 10 dias	10 a 38% (2 meses)	Semi-perene
Tomilho	4.500.000 - 6.000.000	5.000.000	25 - 30 cm	10 cm			0,5 - 1 cm	8°C	26°C	22°C			4 meses